



MIKROSPORIJA

Mikrosporija je glivična bolezen kože, ki jo povzroča gliva *Microsporum canis*. Bolezen je že več let razširjena v številnih krajih po Sloveniji, najpogostejša pa je v Ljubljani in njeni okolici. Bolezen najpogosteje prenašajo mačke, redkeje tudi psi. Zbolijo predvsem mlade in oslabele živali ter potepuške mačke brez lastnika. Na oboleli živali se bolezen lahko pokaže z žariščnim izpadom dlake, lahko pa jo prenašajo tudi na videz zdrave živali.

Mikrosporija je zelo nalezljiva bolezen. Najpomembnejši vir okužbe je direkten stik z obolelo živaljo. Zbolijo predvsem otroci, ki se igrajo z bolnimi muckami. Možen je tudi posreden način prenosa okužbe prek dlak, lusk in raznih predmetov iz okolja, kjer se zadržuje okužena žival. Bolezen se lahko prenaša tudi med ljudmi s telesnim stikom, npr. med družinskimi člani ali med otroci v vrtcih in šolah.

Bolezenska žarišča se največkrat pojavijo na odkritih delih telesa, rokah, nogah, obrazu, vratu, lahko pa tudi na trupu in v lasišču. Obolela mesta so ostro omejena od zdrave kože, običajno velikosti kovanca, pordela, z drobnim luščenjem ob robu. Okužba lasišča je najpogostejša pri majhnih otrocih. Na okuženih mestih so lasje odlomljeni tik nad površino kože, koža pa je prekrita z drobnimi luskami. Mikrosporija ni življenjsko nevarna bolezen, razen roženega sloja kože in las gliva ne prizadene drugih organov.

Bolezen potrdimo z laboratorijskim pregledom kože. V kožnih luskah iz obolelih žarišč ali v bolnih laseh vidimo v mikroskopu glivice, ki jih dokažemo tudi na specialnih gojiščih. Koristen je tudi pregled z Woodovo svetilko. Če z njo v temnem prostoru posvetimo na bolno kožo ali lase, se ti zelenkasto svetijo.

Mikrosporijo uspešno zdravimo, zdravljenje pa lahko traja več mesecev. Predpišemo mazila, ki zavirajo rast gliv. Z njimi mažemo obolela žarišča 2 – 3 krat dnevno. Če so spremembe na lasišču, bolno mesto obrijemo ali ostrižemo lase nekaj centimetrov v zdravo in mažemo s predpisanim mazilom. Če je obolelih žarišč veliko ali pri okužbi lasišča predpišemo tudi tablete, ki delujejo zaviralno na glive. Zdravljenje s tabletami običajno traja največ 4 tedne, pri mikrosporiji lasišča in drugih poraslih delov kože pa je potrebno daljše zdravljenje. V času jemanja tablet uporabljamo tudi mazilo, z njim nadaljujemo zdravljenje tudi po končanem uživanju tablet. Nosečnice in doječe matere tablet ne smejo uživati!

V času zdravljenja naj bodo oboleli predeli pokriti z gazo ali obližem. S tem zmanjšamo možnost prenosa okužbe na druge dele telesa in na ljudi v okolici. Za potrditev ozdravitve je vedno potrebna negativna mikološka preiskava kože. Če z zdravljenjem prehitro prenehamo, se bolezen lahko ponovi ali prenese na druge ljudi.

Če ima otrok bolezenske spremembe na odkritih delih telesa, ne sme obiskovati šole ali vrtca in se družiti z vrstniki, dokler tega ne dovoli zdravnik. V času zdravljenja otrok ne sme k pouku telesne vzgoje, ker je takrat možnost prenosa okužbe zelo velika.

Starši otrok, pri katerih je ugotovljena mikrosporija, morajo domače mucke ali pse peljati na pregled k veterinarju. Obolelo žival je možno v nekaj tednih uspešno pozdraviti, vendar moramo pri tem dosledno upoštevati vsa navodila veterinarja. Če so se otroci okužili pri potepuških mačkah, morajo starši o tem obvestiti veterinarja. Otrokom odsvetujemo igro z nepoznanimi muckami in muckami brez lastnika.

Zdravstvena služba prijavlja vse odkrite primere bolezni. Na podlagi prijavi ukrepa tudi epidemiološka služba.

DVA DNI PRED KONTROLO IN NA DAN KONTROLE NE MAŽITE OBOLELIH MEST !