

KDAJ OBIŠČEMO PEDIATRIČNO NUJNO MEDICINSKO POMOČ (PNMP)? NUJNA STANJA V PEDIATRIJI

KAJ JE NUJNA MEDICINSKA POMOČ?

Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov medicinskega in zdravstvenega osebja pri bolniku, ki je zaradi bolezni ali poškodbe **neposredno življenjsko ogrožen**, oziroma bi lahko zaradi bolezenskih znakov v kratkem času prišlo do ogroženosti življenja in zdravja.

Pravico do pregleda v ambulanti nujne medicinske pomoči ima bolnik le v primeru, da gre za NUJNO STANJE (Pravila ZZZS).

Za vsa nenujna stanja je pristojen izbrani osebni zdravnik, v njegovi odsotnosti pa nadomestni zdravnik v isti enoti oz. zdravstvenem domu.

Pregled v ambulanti PNMP za nenujna stanja je SAMOPLAČNIŠKI. V ambulanti PNMP se ne izdaja napotnic za kontrolne preglede pri specialistih, nenujnih receptov za stalno terapijo in ne receptov za zdravila, ki so v prosti prodaji.

KONTAKTI

PNMP: PEDIATRIČNA NUJNA MEDICINSKA POMOČ
ZD Ljubljana - Center, Metelkova ul. 9

Delovni čas:

Vsako noč: od 19:00 – 7:00

Sobote, nedelje in prazniki: od 7:00 – 19:00

**Pred prihodom v dežurno službo se posvetujete z dežurno ekipo na
tel. št. 01/ 47 23 888.**

KDO IMA PREDNOST PRI OBRAVNAVI?

- NAJBOLJ ŽIVLJENJSKO OGROŽENI PO TRIAŽNEM POSTOPKU
- DOJENČKI DO TRETJEGA MESECA STAROSTI
- OTROCI Z RAKAVIMI BOLEZNIMI
- OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
- OTROCI, KI PREJEMAJO IMUNOSUPRESIVNO ZDRAVLJENJE

NUJNA STANJA V PEDIATRIJI

MOTNJE ZAVESTI			→	Pretirana zaspanost ali pretirana razdražljivost, omotica, nezavest, itd.
KRČI / KONVULZIJE			→	Epileptični napad, vročinski krči
TEŽKO DIHANJE			→	<ul style="list-style-type: none"> Povečano dihalno delo: ugrezane jamice pod vratom, podaljšan izdih, ugrezane medrebrnih prostorov, slišno piskanje v izdihu, stokanje pri izdihu, plapolanje nosnih kril, poudarjeno dihanje s trebuhom Lajajoč kašelj s piskanjem pri vdihu ali piskanjem pri vdihu in izdihu
starost	normalna frekvenca dihanja (v mirovanju, ob normalni telesni temperaturi in šteta v spanju)	povišana frekvenca dihanja		
novorojenčki	30 - 40	60 - 70		
dojenčki	20 - 30	50 - 70		
otroci 1 - 6 let	20 - 24	40 - 50		
starejši otroci	16 - 18			
BOLEČINA			→	Nenadno nastale močne bolečine, ki se stopnjujejo in se po protibolečinskih zdravilih v uri / dveh ne umirijo oz. se le za kratek čas
NEUSTAVLJIVO BRUHANJE IN NEZMOŽNOST VNOSA TEKOČIN			→	Več kot 6x dnevno s primesjo krvi, obilne sluzi, mrzlico in / ali izpuščajem
ZELO POGOSTO ODVAJANJE TEKOČEGA BLATA IN NEZMOŽNOST VNOSA TEKOČIN			→	Srbenje, koprivnica, rdečica, otečene ustnice, težko dihanje, omotica, trebušni krči, bruhanje, nezavest
SISTEMSKE ALERGIJSKE REAKCIJE			→	
VROČINA, KI PO UPORABI ANTIPIRETIKOV V 1-2 URAH NE ZNIŽA ZA VSAJ 1°C Normalna telesna temperatura je med 36,8 °C in 37,2 °C, merimo jo v mirovanju - ne po aktivnosti otroka in vsaj 2 uri po jedi. Meritve na čelu odsvetujemo.			→	Nad 39°C Nad 38°C pri novorojenčku Nad 38°C pri sicer neprizadetem otroku, mlajšem od 2 let, traja dlje kot 48 ur Nad 38°C pri sicer neprizadetem otroku, starejšemu od 2 let, traja dlje kot 4 dni
VEČJA GNOJNA VNETJA KOŽE IN VEČJE LOKALNE REAKCIJE PO PIKIH ŽUŽELK			→	Z vnetjem bezgavk v bližini vnetja ali širjenjem po mezgovnicah
POŠKODBE			→	Poškodbe glave, udarnine, zvini / zlomi, večje odprte rane, nezaustavljiva krvavitev
TUJEK ALI SUM NA TUJEK			→	V prebavilih, v dihalih, očesu, ušesu, nosu, itd.
NEIZTISLJIV IZPUŠČAJ – PODKOŽNE KRVAVITVE				
OPEKLINE, POŠKODBE				
Težje poškodbe, večje opekline: prvih 24 ur po dogodku napotnica ni potrebna, obravnava na urgentnem bloku UKC Ljubljana				
PODHLADITEV, PREGRETJE				
ZAUŽITJE / IZPOSTAVLJENOST STRUPENIM SNOVEM				
NENADNA POSLABŠANJA KRONIČNIH BOLEZNI				
SAMOMORILNOST				