

PREKINJANJE KRČEV Z MIDAZOLAMOM V USTNO VOTLINO (EPISTATUS PFS®)

Zdravilo EPISTATUS PFS se uporablja za prekinjanje vročinskih krčev ali epileptičnih napadov, ki trajajo več kot 2 - 3 minuti.

Zdravilo je pakirano v škatlici, v kateri so tri oz. štiri napolnjene brizge in pisno navodilo za uporabo. Ena brizga je za enkratno uporabo. Tekočina, ki po uporabi ostane v brizgi, ni namenjena kasnejši uporabi. Pred uporabo je potrebno preveriti rok uporabe zdravila.

Zdravilo se aplicira v ustno (v medicinskem besedišču bukalno) votlino, to je prostor med notranjo stranjo lica in zgornjo ali spodnjo dlesnijo. Zdravilo se potem vsrka v krvni obtok in potuje do možganov, kjer začne hitro delovati.

Pri odmerjanju zdravila morate upoštevati zdravnikova navodila.

Otrok naj ima vedno pri sebi dve brizgi v originalni ovojnini – v vrtcu, na sprehodu, v šoli...

POSTOPEK UKREPANJA PRI KRČIH IN APLIKACIJA ZDRAVILA:

- Otroka takoj namestimo v bočni položaj na varni podlagi.
POMEMBNO: Otroka med krči ne držimo v naročju in ga ne pestujemo.
- Če traja krč več kot 2 minuti, pripravimo zdravilo EPISTATUS PFS.
- Napolnjeno brizgo vzamemo iz ovojnine.
- Odstranimo rdeč pokrovček na brizgi in pripravimo predpisani odmerek zdravila.



- Otrokovo glavo poravnamo s podlago.
- Razpremo otrokove ustnice in vstavimo konico brizge v prostor med notranjo stranjo lica in zgornjo ali spodnjo dlesnijo.
POMEMBNO: Brizge na vstavimo med otrokove zobe, ker jo lahko pregrizne.
- Zdravilo počasi iztisnemo v prostor med notranjo stranjo lica in spodnjo ali zgornjo dlesnijo; če je možno pol v zgornjo in preostalo polovico v spodnjo ustno votlino.
- Brizgo umaknemo iz ust in nežno stisnemo otrokove ustnice, da zdravilo ne izteče ven.
- Uporabljeno brizgo zavržemo.



Nadaljevanje na naslednji strani →

10. Otroka ponovno namestimo v bočni položaj.



V primeru, da krči po 5 minutah ne prenehajo, najprej preverimo dihanje:

- Če otrok diha normalno, ponovno apliciramo zdravilo, vendar polovični odmerek. Če po drugem odmerku ni učinka, pokličemo 112.
- Če postane otrokovo dihanje plitvo, pokličemo 112 in ne apliciramo drugega odmerka zdravila.

Pripravila: Karmen Tomažič, dr. med., spec.

Sprejeto na komisiji ZVPO in ZVŠOM

Pregledala: dr. Tanja Golli, dr. med., Pediatrična klinika, Ljubljana