



## MIKROSPORIJA

Mikrosporija je glivična bolezen kože, ki jo povzroča gliva *Microsporum canis*. Bolezen je že več let razširjena v številnih krajih po Sloveniji, najpogostejša pa je v Ljubljani in njeni okolici.

Bolezen najpogosteje prenašajo mačke, redkeje tudi psi. Zbolijo predvsem mlade in oslabele živali ter potepuške mačke brez lastnika. Na oboleli živali se bolezen lahko pokaže z žariščnim izpadom dlake, lahko pa jo prenašajo tudi na videz zdrave živali.

Mikrosporija je zelo nalezljiva bolezen. Najpomembnejši vir okužbe je direkten stik z obolelo živaljo. Zbolijo predvsem otroci, ki se igrajo z bolnimi muckami. Možen je tudi posreden način prenosa okužbe prek dlak, lusk in raznih predmetov iz okolja, kjer se zadržuje okužena žival. Bolezen se lahko prenaša tudi med ljudmi s telesnim stikom, npr. med družinskimi člani ali med otroci v vrtcih in šolah.

Bolezenska žarišča se največkrat pojavijo na odkritih delih telesa, rokah, nogah, obrazu, vratu, lahko pa tudi na trupu in v lasišču. Obolela mesta so ostro omejena od zdrave kože, običajno velikosti kovanca, pordela, z drobnim luščenjem ob robu. Okužba lasišča je najpogostejša pri majhnih otrocih. Na okuženih mestih so lasje odlomljeni tik nad površino kože, koža pa je prekrita z drobnimi luski. Mikrosporija ni življenjsko nevarna bolezen, razen roženega sloja kože in las gliva ne prizadene drugih organov.

Bolezen potrdimo z laboratorijskim pregledom kože. V kožnih luskih iz obolelih žarišč ali v bolnih laseh vidimo v mikroskopu glivice, ki jih dokažemo tudi na specialnih gojiščih. Koristen je tudi pregled z Woodovo svetilko. Če z njo v temnem prostoru posvetimo na bolno kožo ali lase, se ti zelenkasto svetijo.

Mikrosporijo uspešno zdravimo, zdravljenje pa lahko traja več mesecev. Predpišemo mazila, ki zavirajo rast gliv. Z njimi mažemo obolela žarišča 2 – 3 krat dnevno. Če so spremembe na lasišču, bolno mesto obrijemo ali ostrizemo lase nekaj centrimetrov v zdravo in mažemo s predpisanim mazilom. Če je obolelih žarišč veliko ali pri okužbi lasišča predpišemo tudi tablete, ki delujejo zaviralno na glive. Zdravljenje s tabletami običajno traja največ 4 tedne, pri mikrosporiji lasišča in drugih poraslih delov kože pa je potrebno daljše zdravljenje. V času jemanja tablet uporabljamo tudi mazilo, z njim nadaljujemo zdravljenje tudi po končanem uživanju tablet. Nosečnice in doječe matere tablet ne smejo uživati!

V času zdravljenja naj bodo oboleli predeli pokriti z gazo ali obližem. S tem zmanjšamo možnost prenosa okužbe na druge dele telesa in na ljudi v okolici. Za potrditev ozdravitve je vedno potrebna negativna mikološka preiskava kože. Če z zdravljenjem prehitro prenehamo, se bolezen lahko ponovi ali prenese na druge ljudi.

Če ima otrok bolezenske spremembe na odkritih delih telesa, ne sme obiskovati šole ali vrtca in se družiti z vrstniki, dokler tega ne dovoli zdravnik. V času zdravljenja otrok ne sme k pouku telesne vzgoje, ker je takrat možnost prenosa okužbe zelo velika.

Starši otrok, pri katerih je ugotovljena mikrosporija, morajo domače mucke ali pse peljati na pregled k veterinarju. Obolelo žival je možno v nekaj tednih uspešno pozdraviti, vendar moramo pri tem dosledno upoštevati vsa navodila veterinarja. Če so se otroci okužili pri potepuških mačkah, morajo starši o tem obvestiti veterinarja. Otrokom odsvetujemo igro z nepoznanimi muckami in muckami brez lastnika..

Zdravstvena služba prijavlja vse odkrite primere bolezni. Na podlagi prijav ukrepa tudi epidemiološka služba.

**DVA DNI PRED KONTROLO IN NA DAN KONTROLE NE MAŽITE OBOLELIH MEST !**