



PREKINJANJE KRČEV Z MIDAZOLAMOM V USTNO VOTLINO

Midazolam se uporablja za prekinjanje vročinskih krčev in epileptičnih napadov, ki trajajo več kot 2 - 3 minuti. Zdravilo je pakirano v škatli, v kateri so napolnjene brizge in navodilo za uporabo. Ena brizga je za enkratno uporabo. Tekočina, ki po uporabi ostane v brizgi, ni namenjena kasnejši uporabi. Pred uporabo je potrebno preveriti rok uporabe zdravila.

Zdravilo se aplicira v ustno (bukalno) votlino, to je prostor med notranjo stranjo lica in zgornjo ali spodnjo dlesnijo. Po aplikaciji zdravilo potuje v krvni obtok in naprej do možganov, kjer začne hitro delovati. Pri odmerjanju zdravila je potrebno upoštevati zdravnikova navodila.

Otrok naj ima VEDNO PRI SEBI DVE BRIZGI V ORIGINALNI OVOJNINI, v vrtcu, na prehodu, v šoli...

POSTOPEK UKREPANJA PRI KRČIH IN APLIKACIJA ZDRAVILA

1. Otroka takoj namestimo v bočni položaj na varni podlagi. Med krči ga ne držimo v naročju in ga ne pestujemo.
2. Če traja krč več kot 2 minuti, pripravimo zdravilo.
3. Napolnjeno brizgo vzamemo iz ovojnine.
4. Odstranimo pokrovček na brizgi in pripravimo predpisani odmerek zdravila.
5. Otrokovo glavo poravnamo s podlago.
6. Razpremo otrokove ustnice in vstavimo konico brizge v prostor med notranjo stranjo lica in zgornjo ali spodnjo dlesnijo. Brizgo na vstavimo med otrokove zobe, ker jo lahko pregrizne.
7. Zdravilo počasi iztisnemo v prostor med notranjo stranjo lica in spodnjo ali zgornjo dlesnijo; če je možno pol v zgornjo in preostalo polovico v spodnjo ustno votlino.
8. Brizgo umaknemo iz ust in nežno stisnemo otrokove ustnice, da zdravilo ne izteče ven.
9. Uporabljeno brizgo zavržemo.
10. Otroka ponovno namestimo v bočni položaj.



Če krči po 5 minutah ne prenehajo, najprej preverimo dihanje:

- Če otrok diha normalno, ponovno apliciramo zdravilo, vendar polovični odmerek. Če po drugem odmerku ni učinka, pokličemo 112.
- Če postane otrokovo dihanje plitvo, pokličemo 112 in ne apliciramo drugega odmerka zdravila.